

**Patientkort til Qsiva – til kvinder i den fødedygtige alder**  
**Prævention og svangerskabsforebyggelse**

**Det skal du vide**

- Qsiva er et lægemiddel til at hjælpe voksne med at tabe sig og holde vægten nede.
- Qsiva kan skade det ufødte barn alvorligt, hvis det tages under graviditet.

**Det skal du gøre**

- Læs indlægsedlen og patientvejledningen omhyggeligt inden brug.
- Brug meget effektiv svangerskabsforebyggelse under din behandling med topiramal og i mindst 4 uger efter den sidste dosis topiramal. Lægen vil rådgive dig om, hvilken metode der passer bedst til dig.
- Gå til læge mindst en gang om året for at få revideret din behandling.
- Hvis du tror, at du er blevet gravid, skal du kontakte lægen med det samme.
- Hvis du overvejer at få et barn, må du ikke stoppe med at bruge svangerskabsforebyggende metoder, før du har talt med lægen.

Bed lægen om patientvejledningen. Behold dette kort.

Version 1, accepteret af Lægemiddelstyrelsen 05/2024.



**Sjúklingakort fyrir Qsiva – Fyrir konur sem geta orðið þungaðar**  
**Getnaðarvarnir og aðgerðir til að koma í veg fyrir þungun**

**Það sem þú þarft að vita**

- Qsiva er lyf til þess að auðvelda fullorðnum einstaklingum að léttast og halda þyngdinni niðri.
- Qsiva getur valdið alvarlegum skaða hjá fósturi ef það er notað á meðgöngu.

**Það sem þú þarft að gera**

- Lestu fylgiseðilinn og Leiðbeiningar fyrir sjúkling vandlega fyrir notkun lyfsins.
- Notaðu örugga getnaðarvörn meðan á meðferð með topiramati stendur og í a.m.k. 4 vikur eftir síðasta skammt af topiramati. Læknirinn ráðleggur þér notkun getnaðarvarnar sem hentar þér.
- Þú skalt fara til læknisins minnst árlega til að láta endurmeta meðferðina.
- Ef þú heldur að þú sért þunguð skaltu ræða við lækinn tafarlaust.
- Ef þú ert að hugsa um að verða barnshafandi, ekki hætta að nota getnaðarvörn fyrr en þú hefur rætt við lækinn.

Þú skalt biðja lækinn um Leiðbeiningar fyrir sjúkling. Geymdu kortið.

Útgáfa 1, samþykkt af Lyfjastofnun 04/2024



PA-11-004-01  
PCD506173