

**Karta pacjenta dotycząca leku Qsiva – dla kobiet  
w wieku rozrodczym**

**Antykoncepcja i zapobieganie ciąży**

**VIVUS**

**Co należy wiedzieć**

- Qsiva jest lekiem przeznaczonym do stosowania u dorosłych w celu kontroli masy ciała
- Lek Qsiva przyjmowany w okresie ciąży może poważnie zaszkodzić nienarodzonemu dziecku.

**Co należy zrobić**

- Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania oraz instrukcją dla pacjenta.



- W trakcie leczenia topiramatem i przez co najmniej 4 tygodnie po przyjęciu ostatniej dawki topiramatu należy stosować wysoce skuteczną metodę antykoncepcji. Lekarz doradzi, która metoda będzie najbardziej odpowiednia dla pacjentki.
- Przynajmniej raz w roku należy udać się do lekarza w celu kontroli leczenia.
- Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli pacjentka planuje mieć dziecko, nie należy przerywać stosowania antykoncepcji przed konsultacją z lekarzem.

Należy poprosić lekarza o wydanie Przewodnika dla pacjenta lub zeskanować ten kod QR.  
Tę kartę należy zachować.



Qsiva PL\_PAC V 3.026.10.2024 PCD506170 PA-11-002-01